

9-Referências bibliográficas

Abetz, L., Jacoby, A., Baker, G. A., McNulty, P. (2000). Patient-based assessments of quality of life in newly diagnosed epilepsy patients: validation of the NEWQOL. *Epilepsia* 41, 1119-1128.

Allen, A. J., Leonard, H., Swedo, S. E. (1995). Current knowledge of medications for the treatment of childhood anxiety disorders. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry*, 34, 976-986.

Alves, D. (2005). Tratamento da epilepsia. *Epilepsy*, 21, 315-322.

Annegers, J. F., Hauser, W.A., Elveback, L.R. (1979). Remission of seizures and relapse in patients with epilepsy. *Epilepsia*, 20, 729-737.

Egel J Jr(ed).Surgical Treatment of the epilepsies. *Raven Press*, 511-540.

Baker, A., Jacoby, A., Buck, D., Stalgis, C., Monnet, D. (1997). Quality of life of people with epilepsy: an European study. *Epilepsia* 38, 353-362.

Baker, G., A (1995). Health-related quality of life issues: Optimizing patient outcomes. *Neurology* 45 S29-S34.

Baker, G., A., Brooks J., Buck, D., Jacoby, A. (2000). The stigma of epilepsy: a European perspective *Epilepsia* 41, 98-104.

Baker, G. A. (2002). The psychosocial of epilepsy. *Epilepsia*, 43(6), 26-30.

Barlow, D. (1988). *Anxiety and Its Disorders*. New York: Guilford Press.

Basbaum, A., Jessel, T, M (2000). *The perception of pain*. In *Principles of neural science* (4ed.): McGraw Hill.

Baskind, R., Birbeck, G.L (2005). Epilepsy-associated stigma in sub-Saharan Africa: the social landscape of a disease. *epilepsy Behav*, 7(1), 68-73.

Beck, A, T., Emery, Gary. (1985). *Anxiety Disorders and Phobias: a cognitive perspective*. New York Basic Books.

Beck, A, T (1979). *Cognitive Therapy and the Emotional Disorders*. New York: Penguin.

Benifla,M.,Osubo,H.,Ochi,A.,Weiss,S,K.,Donner,E,J.,Shroff,M.,Chuang,S.,Hawkins,C.,Drake,J,M., Elliott, I., Smith, M,L., Snead, O, C., Rutka, J,T. (2006). Temporal lobe surgery for intractable epilepsy in children: an analysis of outcomes in 126 children. *Neurosurgery*, 59 (6).

Bernik, A., Corregiari, F, M., Braun, I, M (2002). Panic attacks in the differential diagnosis and treatment of resistant epilepsy. *Depress Anxiety*, 15(190-192).

- Bernik, M., Tess, V, Barros, N.T.P. (1999). Ansiedade. *Revista Psiquiatria e Prática Médica*, vol.56 (edição especial), 22-29.
- Blumer, D., Montouris, G., Hermann, B. (1995). Psychiatric morbidity in seizure patients on a neurodiagnostic monitoring unit. *J. Neuropsychiatry Clin Neurosci* 7, 445-456.
- Boutros, N., N; Juo-Tzu, J; Shehata, A; Milana, R, B. (1995). Epileptic psychiatric patients, a special population. *J Ment health*, 4 (1), 79-84.
- Bransford, J. (1979). *Human cognition: learning, understanding and remembering*. Belmont Clif: Wadsworth Pub. Co.
- Bransford, J., Stein, Barry, S (1993). *The ideal problem solver: a guide for improving thinking, learning and creativity*. New York: W. H. Freeman.
- Brodier, M., J. (2000). *The European Paper on Epilepsy, A Call for Action*. Belgium.
- Brodier, M., J. 2003). European With Paper on Epilepsy. *Epilepsy*, 44, 12-75.
- Bronowski, J. (1983). *Introdução à Atitude Científica*. Lisboa: Livros Horizonte.
- Bullinger, M., Steinbüchel, N. (2001). *Quality of life: measurement of outcome*. In Pfäfflin M, Fraser RT, Thorbecke R, Specht V, Wolf P (eds). *Comprehensive Care for People with Epilepsy*. London: John Libbey Ltd.
- Caplan, R., Comair, Y., Shewmon, D, A., Jackson, L., Chugani, H, T., Peacock, W, J (1992). Intractable seizures, compulsions, and coprolalia: a pediatric case study. *J Neuropsychiatry Clin Neurosci*, 4, 315-319.
- Carvalho, E. J. (2002). *Metodologia do trabalho científico "Saber-Fazer" da investigação para Dissertações e teses*. Lisboa: Escolar Editora.
- Choi-Kwon, S., Chung, C., Kim H, et al. . (2003). Factors affecting the quality of life in patients with epilepsy in Seoul, South Korea. *Acta Neurol Scand* 108, 428-134.
- Commission on Classification and Terminology of the International League Against Epilepsy (1981). Proposal for revised clinical and electroencephalographic classification of epileptic seizures. *Epilepsia*, 22, 489-501.
- Commission on Classification and Terminology of the International League Against Epilepsy (1989). Proposal for revised clinical and electroencephalographic classification of epileptic seizures. *Epilepsia*, 30, 389-399.
- Cornaggia, C., M., Beghi, M., Provenzi, M., Beghi, E. . (2006). Correlation between cognition and behavior in epilepsy. *Epilepsia*, 47(2), 34-39.
- Costello, J., Mustillo, S., Erkanli, A., Keeler, G., Angold, A. (2003). Prevalence and development of psychiatric disorders in childhood and adolescence. *Arch Gen Psychiatry*, 60, 837-844.
- Cramer, J., A. (1994). Quality of life for people with epilepsy. *Neurol Clin* 12, 1-13.

- Cramer, J., A., Blum, D., Fanning, K., et al. (2004). Epilepsy Impact Project Group: the influence of comorbid depression on health resource utilization in community sample of people with epilepsy. *Epilepsy Behav*, 5, 337-342.
- Cramer, J., A., Blum, D., Reed, M., et al. (2003). Epilepsy Impact Project Group: the influence of comorbid depression on seizure severity. *Epilepsia*, 44, 1578-1584.
- Cramer, J. A., Perrine, K., Devinsky, O., Bryant-Comstock, L., Meador, K., Hermann, B. (1998). Development and cross-cultural translations of a 31-item quality of life in epilepsy inventory. *Epilepsia*, 39 (1), 81-88.
- Cramer, J. A., Perrine, K., Devinsky, O., & Meador, K (1996). A brief questionnaire to screen for quality of life in epilepsy: The QOLIE-10. *Epilepsia* (6), 577-582.
- Currie, S., Heathfield, K. W., Henson, R. A., Scott, D. F. (1971). Clinical course and prognosis of temporal lobe epilepsy: a survey of 666 patients. *Brain* 1971;94:173-90. *Brain*94, 173-190.
- Derogatis, L., R. . (1983). SCL-90-R Administration, Scoring and Procedures *Manual-II*. Towson, MD: *Clinical Psychometric Research*.
- Devinsky, O., Cramer, J., Baker, G. (1999). *The comprehensive CD-rom on Epilepsy, Quantitative measures of assessment*. Lippincott: Williams & Wilkins.
- Devinsky, O., Penry, J, K. (1993). Quality of life in epilepsy: the clinician's view. *Epilepsia*, 34 (Suppl 4), S4-S7.
- Devinsky, O., Vickrey, B.G., Cramer, J., Perrine, K., Hermann, B., Meador, K., & Hays, R. D. (1995). Development of the Quality of Life in Epilepsy Inventory. *Epilepsia*, 36 (11), 1089-1104.
- Eaton, W., W., Dryman, A., Weissman, M.M. (1991). *Panic and phobia, In Robins, L.N. & Regier, D.A. (Eds.) Psychiatric disorders in America: The epidemiologic catchment area study*. New York: Maxwell Macmillan International.
- Edeh, J. T., B,K;Corney,R,H. (1990). Epilepsy,psychiatry morbidity, and clinic patients and social dysfunction in general practice Comparison between hospital clinic patients and clinic nonattenders.*Neuropsychol Bahav Neurol*, 3, 180-192.
- Engel, J. (1998). *Epilepsy: A comprehensive Textbook*. Philadelphia: Lippincott-Raven.
- Engel, J., Jr. (2001). ILAE Commission Report. A proposed diagnostic scheme for people with epileptic seizures and with epilepsy: Report of the ILAE Task Force on Classification and Terminology. *Epilepsia*, 42(6), 796-803.
- Erica, K., Johnson., Jana, E., Jones, Michael Seidenberg., Bruce, P., Hermann (2004). The Relative Impact Of Anxiety, Depression, and Clinical Seizure Features an Health-related Quality af Life in Epilepsy *Epilepsia*, 45(5), 544.550.
- Erickson, J. C., Clapp, L. E., Ford, G., Jabbari, B. (2006). Somatosensory auras in refractory temporal lobe epilepsy.*Epilepsia*, 47(1), 202-207.

- Ettiger, A., Reed, M., Cramer, J. (2004). Epilepsy Impact Project Group. Epilepsy or asthma. *Neurology*, 636, 1008-1014.
- Eysenck, M., W. (1997). *Anxiety and cognition: a unified theory*. Hove, East Sussex. UK Psychology Press.
- Fernandes, P., T., Sousa, E, A, P. (2001). Identification of family variables in parent's groups of children with epilepsy. *Arquivos de Neuropsiquiatria*, 59(4), 854-882.
- Fleck, M., P, A; Leal, O, F; Louzada, S; Xavier, M; Chachamovich, E; Vieira, G, et al. . (1999). Desenvolvimento da versão em português do instrumento de avaliação de qualidade de vida da OMS (WHOQOL-100). *Rev Bras Psiquiatr.* , 21(1), 19-28.
- Flor-Henry, P. (1969). Psychosis and temporal lobe epilepsy: a controlled investigation. *Epilepsia*, 10, 363-395.
- Frank Gilliam, V. V., Jewell Carter, Kelly Brown, Hrvoje Hecimovic. (2004). Depression in epilepsy: Ignoring Clinical Expression of Neuronal Network Dysfunction? *Epilepsia*, 44 (Suppl.2), 28-33.
- Freeman, R. (2006). Cardiovascular manifestations of autonomic epilepsy. *Clin Auton Res*, 16(1), 12-17.
- Gibbs, F., A; Gibbs, E, L (1952). *Atlas of Electroencephalography Addison-Wesey*. Cambridge: Mass.
- Gill, T. F., A (1994). A critical appraisal of the quality of quality-of-life measurements. *JAMA*, 1994(272(8)), 619-626. .
- Gilliam, F. (2002). Optimizig Health Outcomes in Active Epilepsy. *Neurology*, 58(5), S9-S20.
- Gilliam, F., Hecimovic, H., Sheline, Y (2003). Psychiatric comorbidity, health, and function in epilepsy. *Epilepsy Behav* 4, S26-S30.
- Goffman, E. (1963). *Stigma: notes on the management of spoiled identity* New York: Touchstone.
- Goldstein, M., A., Harden, C, L. (2001). Epilepsy and anxiety. *Epilepsy Behav* 1, 228-234.
- Goodrige, D. M., S,S. (1983). Epileptic seizures in a population of 6000.I:Demography, diagnosis and classification, and role of the hospital service. *Br Med J (Clin Pes Ed)*, 287(6393), 641-644.
- Graeff, G. (1997). *Neurobiologia das doenças mentais*. (5 ed.). São Paulo: Lemos Editorial.
- Gray, J., A (1987). Perspectives on anxiety and impulsivity: A commentary. *Journal of Research in Personality*, 21, 493-509.
- Gudmundsson, G. (1966). Epilepsy in Iceland. A Clinical and epidimiologic investigation *Acta Neural Scan*, 43(25), 121-124.

Guerrant, J. A., W, W; Fischer, A; Weinstein, M, R; Jaros, R, M; Deskins, A. (1962). *Personality in Epilepsy*: Springfield. Hill, D. (1953). Psychiatric disorders of epilepsy. *Medical Press*, 20, 473-475.

Guerreiro, C., A, M., Guerreiro, M, M. (1999). *Epilepsia: O paciente otimamente controlado*. São Paulo: Lemos Editorial.

Harden, C., L., Goldstein, M, A. (2002). Mood disorders in patients with epilepsy: epidemiology and management. . *CNS Drugs* (16), 291–302.

Hermann, B. P., Seidenberg, M., Bell, B. . (2000). Psychiatric comorbidity in chronic epilepsy: identification, consequences, and treatment of major depression. . *Epilepsia*, 41(Suppl.2), S31-S41.

Hirshfeld, D. R., Rosenbaum, J. F., Fredman, S. J., Kagan, J. (1999). *The neurobiology of childhood anxiety disorders*. In: Charney DS, Nestler EJ, Bunney BS, editors. *Neurobiology of mental illness*. New York: Oxford University Press.

Huppertz, H., J., Franck, P., Korinthenberg, R., Schulze-Bonhage, A (2002). Recurrent attacks of fear and visual hallucinations in a child *J Child Neurol* 17, 230-233.

Indaco, A., Carrieri, P, B., Nappi, C., Gentile, S., Striano, S (1992). Interictal depression in epilepsy. *Epilepsy Res*, 12, 45-50.

International Classification of Functioning and Disability, B.-D. (1999). Geneva: World Health Organization.

Jacoby, A., Baker, G. A., Steen, N., Potts, P., Chadwick, D, W. (1996). The clinical course of epilepsy and its psychosocial correlates: findings from a U.K. Community study. *Epilepsia*, 37(2), 148-161.

Jensen, I. L., J, K. (1979). Psychoses in drug-resistant temporal lobe epilepsy. *Journal of Neurology Neurosurgery and Psychiatry*, 42, 948-954.

Johnson, E., K., Jones, J, E., Seidenberg, M., Hermann, B, P. (2004). The relative impact of anxiety, depression, and clinical seizure features on health-related quality of life in epilepsy. *Epilepsia* 45, 544–550.

Kanai, K., Hirose, S., Oguni, H., et al. . (2004). Effect of localization of missense mutations in SCN1A on epilepsy phenotype severity. *Neurology* 63, 329-334.

Kanner, A., M., Soto, A., Gross-Kanner, H (2004). Prevalence and clinical characteristics of postictal psychiatric symptoms in partial epilepsy *Neurology* 2004, 62, 708–713.

Kanner, A. M., Kosak, A.M., Frey, M. (2000). The Use of Sertraline in Patients with Epilepsy: is it Safe? *Epilepsy Behav* 1, 100-105.

Kaplan, P. W. (2004). Reproductive health effects and teratogenicity of antiepileptic drugs *Neurology*, 63 (Suppl 4), S13-S23.

- Karenfort, M., Kruse, B., Freitag, H., Pannek, H., Tuxhorn, I. (2002). Epilepsy surgery outcome in children with focal epilepsy due to tuberous sclerosis complex. *Neuropediatrics*, 2002 Oct;33(5):255-61, 33(5), 255-261.
- Kellett, M., W., Smith, D, F., Baker, G, A. (1997). Quality of life after epilepsy surgery. *J Neurol Neurosurg Psychiatry*, 63, 52-58.
- Kessler, R., C; McGonagle, A; Zhao, S; Nelson, CB; Hughes, M.; Eshleman, S; Wittchen, H, U; Kendler, K, S., (1994). Lifetime and 12 month prevalence of DSM-III-R psychiatric disorders in the United States. *Archives of General Psychiatry*, 51, 8-19.
- Klose, T. (1999). The contingent valuation method in health care. *Health Policy*, 47, 97-123.
- Knut, S., BjOrnaes, H., Lossiun, MI (2000). Reliability and validity of a Norwegian version of the Quality of Life Epilepsy Inventory (QOLIE-89) *Epilepsia*, 41(1), 91-97.
- Kristensen, O. S., E,H. (1978). Psychomotor epilepsy and psychosis. I. Physical Aspects. *Acta Neurologica Scandinavica* 57, 361-369.
- Kulaksizoglu, I., B., Bebek, N., Baykan, B., Imer, M. (2004). Obsessive-compulsive symptoms after epilepsy surgery. *Epilepsy & Behavior* 113, 8.25.
- Langfitt, J., T. (1997). Cost-effectiveness of anterotemporal lobectomy in medically intractable complex partial epilepsy. *Epilepsia*, 38(2), 154-163.
- Lehrner, J., Kalchmayr, R., Serles, W., et al. (1999). Health related quality of life (HRQOL), activity of daily living (ADL) and depressive mood disorder in temporal lobe epilepsy. *Seizure*, 8, 88-92.
- Leonard R. Derogatis, P. SCL-90-R (Symptom Checklist-90-Revised).
- Lerman, P., Kivity. (1975). Benign focal epilepsy of childhood. A follow-up of 100 recovered patients. *Arch Neurol* 32.
- Lewis, M., A., Hatoon, C, L. (1991). Impact of Children's epilepsy. *Salas I. Leake B Chiofalo N*, 32(3), 365-366.
- Lind, E. L., T; Johannesn, S, I ;Bjorholt, P, G;Nakken, K,O. (1990). Effect of physical training on Aerobic capacity, seizure occurrence and serum level of Antiepileptic drugs in adults with epilepsy. *Epilepsia*, 31, 88-94.
- Long, L., Reeves, Al (1997). The practical aspects of epilepsy: critical components of comprehensive patient care. *J Neurosci Nurs* 29(4), 249-254.
- Lopes Lima, J., M. (2005). Epilepsia – a abordagem clínica. *Rev Port Clin Geral* (21), 291-298.
- MacKay, W. A. (1999). Receptores somatossensitivos. In Neurofisiologia sem lágrimas *Fundação Calouste Gulbenkian* 59-66.

- Marchetti, L., Marques, A.F.H., Kurcgant,D., et al. (2003). Clinical Aspects of Epileptic Psychosis in Brazil. *Epilepsy Behav* *Epilepsy Behav*, 4(2), 133-141.
- Marsh, L., Rao, V. (2002). Psychiatric complications in patients with epilepsy: a review. *Epilepsy Res* (49), 11-33.
- Martin, R. V., L; Gilliam, F; Faught, E. (2005). What are the concerns of older adults living with epilepsy? *Epilepsy Behav.*, 7(2), 297-300.
- McCleskey, E., W., Gold, M, S. (1999). Ion Channels of nociception. *Annu Rev Physiology*, 61, 835-856.
- McNamara, J., O. (1994). Cellular and molecular basis of epilepsy. *Jornal of neuroscience*, 14, 3413-3425.
- Melzack, R., Wall, P, D. (1965). Pain mechanisms: a new theory. *Science*, 150, 971-979.
- Mendez, M., F.,Cummings, J, L.,Benson, D, F. (1986). Depression in epilepsy: significance and phenomenology. *Arch Neurol*, 43, 766-770.
- Mendez, M., F.,Grau, R., Doss, R,C., Taylor, J, L (1993). Schizophrenia in epilepsy:seizure and psychosis variables. . *Neurology*, 43, 1073-1077.
- Meneses, R. F., Ribeiro, J. P., Silva, A. M, DA. (2002). Revisão da literatura sobre a avaliação da qualidade de vida (QDV) de adultos com epilepsia I- Dificuldades na abordagem do tema. *PSICOLOGIA, SAÚDE & DOENÇAS*, III (001), 61-88.
- Meneses, R. F., Ribeiro J.P., Silva, A. M, DA (2002). Revisão da Literatura sobre Avaliação da qualidade de vida (QDV) de adultos com epilepsia. II – Facilidades na Abordagem do tema. *Psicologia, Saúde & Doenças*, 3 (2), 119-139.
- Minayo, M. C. S. (1992). *O desafio do conhecimento. Pesquisa Qualitativa em saúde*. São Paulo- Rio de Janeiro: Ed. Hucitec - ABRASCO.
- Minayo, M. C. S. (1998). *Pesquisa social -Teoria, método e criatividade* Rio de Janeiro: Vozes.
- Moore, P., M., Baker, G,. (2002). The neuropsychological and emotional consequences of living with intractable temporal lobe epilepsy: implications for clinical management. *Seizure* 11, 224-230.
- Morrell, M. J. (2002). Stigma and epilepsy. *2002* 3(6S2), 21-25.
- Mulley, J. C., Scheffer, I. E., Petrou, S., Berkovic, S.F (2003). Channelopathies as a genetic cause of epilepsy. *Curr Opin Neurol*, 16, 171-176.
- Nakken, K., O. (2000). *Should people with epilepsy exercise?* (Vol. 20): Tidsskr Nor Laegeforen.
- Nelson, M. T., Todorovic, S. M., Perez-Reyes, E. (2006). The role of T-type calcium channels in epilepsy and pain. *Curr Pharm Des*, 12(18), 2189-2197.

Niedermeyer. (1990). *Electroencephalography basic principles, clinical applications, and related fields* (5^a ed.). Baltimore: Williams & Wilkins.

O'Brien, P., G., Kennedy, W., Z., Ballard, K., A. (2002). *Enfermagem em saúde mental: Uma integração de teoria e prática*. Lisboa: McGraw-Hill.

Organization, W. H. (1992). *The Tenth Revision of the International Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-10)*. Geneva: WORLDHEALTH ORGANIZATION.

Out of the shadows.- ILAE/ IBE/ WHO (2001). Global Campaign Against Epilepsy. An Introduction to The Global Campaign and its Demonstration Projects.

Owczarek, K. (2003). Anxiety as a differential factor in epileptic versus psychogenic pseudoepileptic seizures *Epilepsy Res* 52(3), 227-320.

Penfield, W., Jasper, HL (1954). *Epilepsy and the functional anatomy of the human brain*. Boston: Little Brown And Company.

Perrine, K., R. (1993). A new quality-of-life inventory for epilepsy patients: Interim results. *Epilepsia*, 34(4), S28-S33.

Peurifoy, R. (1997). *Reneau. Overcoming anxiety*. New York: Henry Holt and Company.

Pond, D., A. (1957). Psychiatric aspects of epilepsy. *J Indian Med Profession* 3, 1441-1451.

Pond, D., A; Bidweel, B, H. (1959). A Survey of epilepsy in fourteen general practices.II Social and psychological aspect. *Epilepsia*, 1, 285-299.

Ponds, R., W., Hendriks, M. (2006). Cognitive rehabilitation of memory problems in patients with epilepsy. *Seizure*, 15(4), 267-273.

Rand. (1993b). *Quality of Life in Epilepsy: The QOLIE inventory – An information resource*. Santa Monica: RAND.

Raven Press Vein, A., M., Djukova, G, M., Vorobieva, O, V. (1994). Is panic attack a mask of psychogenic seizures? A comparative analysis of phenomenology of psychogenic seizures and panic attacks. *Funct Neurol* 9, 153–159.

Regier, D., A., Narrow, W,E., Rae, D, S., Manderscheid, R,W., Locke, B, Z. ,Goodwin, F, K. (1993). The de facto US mental and addictive disorders service system: Epidemiologic catchments area prospective 1 year prevalence rates of disorders in services *Archives of General Psychiatry*, 50, 85-94.

Rivera , B., F, J, Gutiérrez, R, L, Gregório, P, G. (2006). *Tratado de Geriatria para residentes*.

Robertson, D., M. (1988). Epilepsy, Behavior and Cognitive Function. *Gac Méd Méx*, 137(1), 73.

Robertson, M., M (1991). Depression in patients with epilepsy: an overview. *Semin Neurol*, 11, 182-189.

- Robinson, R. (1993). Costs and cost-minimisation analysis. *BMJ*, 307(6906), 726-728.
- Roselyne, R. (1993). *The history of Pain*. London: Harvard University Press.
- Rosen, J., B., Schilkin, J. (1998). From normal fear to pathological anxiety *Psychol Rev* 105, 325-350.
- Ryan, R., Kempner, K., Emlen, A, C (1980). The stigma of epilepsy as a self-concept. *Epilepsia*, 21, 433-444.
- Rutter, M. G., P; Yulle, W. (1970). *A Neuropsychiatric study in childhood*. London: Heinemann, Medical.
- Salgado, P. C. B., Fernandes, P. T., Noronha, A. L. A., Barbosa, F. D., Santos, S., R; Santos, I, B, C Fernandes MGM, Henriques MERM. (2002). Qualidade de vida do idoso na comunidade: aplicação da escala de Flanagan. *Rev Latino-Am Enfermagem*, 10(6), 757-764.
- Schachter, S., C. (2005). Improving quality of life beyond seizure control. *Epileptic Disord.*, 7(1), 34-38.
- Souza, E. A.P., Li, M. L. (2005). The second step in the construction of a stigma scale of epilepsy. *Arq. Neuro-Psiquiatr*, 63(2b).
- Scambler, G., Hopkins, A. (1990). Generating a model of epileptic stigma: the role of qualitative analysis. *Soc Sci Med* 30, 1187-1194.
- Schachter, S. C. (2006). Quality of life for patients with epilepsy is determined by more than seizure control: the role of psychosocial factors. *Expert Rev Neurother*, 6(1), 111-118.
- Schneider, J., W., Conrad, P., Schneider, J, W., Conrad, P. (1983). *Having epilepsy: the experience and control of illness* Philadelphia: Temple University Press.
- Scott, D. F. (1993). *The history of epilepsy to ad 1850*. In: Scott DF (ed.). *The history of epileptic therapy*. New York: The Patheron Publishing Group.
- Serafetinides, E., A; Falconer, M, A. (1962). The effects of temporal lobectomy in epileptic patients with psychosis. *J Ment Sci*, 108584-93., 584-593.
- Shah, P. (2002). Psychosocial aspects of epilepsy *J Indian Med Assoc*, 100(5), 295-298.
- Sherwin, I. P.-M., P; Bancaud, J; Boris, A; Talairach, J. (1982). Prevalence of psychosis in epilepsy as a function of the laterality of the epileptogenic lesion. *Archives of Neurology*, 39, 621-625.
- Shukla, G., D; Srivastava, O, N; Katiyar, B, C; Joshi, V; Mohan, P, K. (1979). Psychiatric manifestations in TLE: a controlled study. *British Journal of Psychiatry*, 135, 411-417.
- Sigurdardottir, K. R., Olafsson, E. (1998). Incidence of psychogenic seizures in Adults: a population-based study in Iceland. *Epilepsia*, 39, 749-752.
- Slater, E. B., A, W; Glitheroe, E (1963). The schizophrenia-like psychoses of epilepsy. *British Journal of Psychiatry* 109, 95-150.

- Small, J., G., Milstein, V; Stevens, J, R (1962). Are psychomotor epileptics different? *Archives of Neurology*, 7, 187-1994.
- Souza, E., A, P; Salgado, P, C, B. (2003). Psychological variables involved in the quality of life of patients with epilepsy *Estud. psicol.* , 8, 165-168.
- Souza, E., A, P; Salgado, P, C, B. (2006). A psychosocial view of anxiety and depression in epilepsy. *Epilepsy & Behavior*, 232-238.
- Stevens, J., R; Hermann, B, P. (1981). Temporal lobe epilepsy, psychopathology, and violence: the state of the evidence. *Neurology* 31, 1127-1132.
- Suuermeijer, T., H,P. (1995). The impact of epilepsy on social Integration and quality of life: Family, peers and education. In: Aldenkamp A, Dreifuss FE, Renier WO et al (eds). *Epilepsy in children and Adolescents*. Boca Raton *Press*, 251-270.
- Taylor, D. C. (1971). Ontogenesis of chronic epileptic psychosis: a re-analysis. *Psychological Medicine*, 1, 247-253.
- Taylor, S. (1998). *Anxiety sensitivity: theory, research and treatment of the fear of anxiety* Mahwah, N. J: L. Erlbaum Associates.
- Thompson, P., J. (1994). *Upton D. Quality of Life in Family Members of Person with epilepsy*. In Trimble MR & Dodson WE. (eds) : *epilepsy and quality of Life*. New York: Raven Press.
- Topno, N., Gopasetty, M. S., Kudva, A. B. L. (2005). Abdominal epilepsy and foreign body in the abdomen--dilemma in diagnosis of abdominal pain. *Yonsei Med J*, 46(6), 870-873.
- Trostle, J. H., W, A; Sharbrough, F, W. (1989). Psychologic and social adjustment to epilepsy in Rochester Minnesota *Neurology*, 39(5), 633-637.
- Urban, M. O., Gebhart, G.F (1999). Central mechanisms in pain *Chronic. pain*, 83, 585-596.
- Vazquez, B., Devinsky, O. (2003). Epilepsy and anxiety. *Epilepsy Behav*, 4 (Suppl. 4), S20-S25.
- Veiga, M., F.,Campos, M, C, R.,Quarantini, L, C.,Mercadante, M, T. (2004). Transtorno Obsessivo-Compulsivo e Tiques em Pacientes com Epilepsia. *J Epilepsy Clin Neurophysiol* 2004; 10 (4 suppl 2): 47-52, 10 (4 suppl 2), 47-52.
- Viberg, M., Blenow, G., Postki, B. (1987). Epilepsy in adolescence: implications for the development of personality. *Epilepsia*, 28(5), 542-542.
- Vickrey, B., G (1993). A procedure for developing a quality-of-life measure for epilepsy surgery patients. *Epilepsia*, 34(4), S22-S27.
- Vickrey, B. G., Perrine, K.R., Hays, R.D., Hermann, B.P., Cramer, J.A., Meador, K.J., & Devinsky, O. (1993a). *Scoring Manual for the QOLIE-89, version 1.0*. Santa Monica: RAND.

Victor, R., D,A,M. (1989). *Principles of Neurology* Singapore: McGraw- Hill.

Weisbrod, B., A. (1961). The valuation of human capital. *Journal of Political Economy* 69(5), 425-436.

Wittchen, H., U., Kessler, R, C., Beesdo, K., Krause, P., Hofler, M., Hoyer, J (2002). Generalized anxiety and depression in primary care: prevalence, recognition, and management. *J Clin Psychiatry* 63(Suppl.8), 24-34.

Yacubian, E. M. T. (2002). Proposta de Classificação das Crises e Síndromes Epilépticas. Correlação Videoeletrencefalográfica. *Rev. Neurociências* 10(2), 49-65.

Zielinsky, J., J. (1982). *Epidemiology*. In: Laidlaw, J. & Richens, A. (eds.) *A textbook of epilepsy* Edinburgh: Churchil Livingstone.

Zimmerman, M., Chelminski, I (2003). Clinician recognition of anxiety Disorders in depressed outpatients. *J Psychiatr Res* 2003;37:325–33., 37, 325-333.

10-Anexos

Anexo 1
Questionário entregue aos doentes

Questionário nº _____

DATA ___ / ___ / ___

Data de nascimento ___ / ___ / ___

Sexo: Masculino () Feminino()

Profissão _____

Habilitações literárias _____

Estado Civil: Casado () Solteiro () Viúvo() União de facto()

Divorciado ()

Existência de filhos? Sim () Não () Número _____

Residência: Cidade _____ Freguesia _____

Tipo de epilepsia _____

Frequência das crises _____

Há quantos anos foi diagnosticada a epilepsia? _____

Toma café com frequência? Sim () Não()

É consumidor de bebidas alcoólicas? Sim () Não()

Pensa que a epilepsia é: desordem neurológica () doença mental ()
desordem de desenvolvimento () outros:()

Quais são suas ideias a respeito da epilepsia?

É uma doença contagiosa? sim () não()

Uma pessoa com epilepsia têm maior possibilidade de desenvolver doença mental? sim () não()

Durante a crise, a pessoa pode engolir a língua? sim () não()

O que pensa que as pessoas sentem ao ver uma pessoa em crise?

medo() preocupação() rejeição() dó() Indiferença() Rejeição ()
vontade de ajudar () impotência ()

Acredita que a epilepsia seja causada por que factores?

factores tóxicos () mau olhado() factores genéticos() castigo de Deus()
doenças infecciosas() traumas ou agentes físicos() dor de cabeça()
Complicações durante o parto () Alcoolismo()

Pensa que tem menos oportunidade de emprego pelo facto de ter epilepsia? Sim () não()

Pensa existir restrições na prática de exercício físico pelo facto de ser epiléptico? Sim () Não ()

Pensa que tem menos capacidade cognitiva pelo facto de ter epilepsia (capacidade de aprendizagem e memória)? Sim () Não ()

Pensa que filhos de doentes com epilepsia têm maior probabilidade de terem malformações? Sim () Não ()

Instruções:

Estas são as perguntas sobre a sua saúde e actividade diária.


Se não tiver a certeza como responder a uma pergunta, tente dar a melhor resposta possível e escreva uma nota da dificuldade que teve.

Por favor, sinta-se à vontade, se precisar de ajuda peça-a.

1. Em geral você diria que a sua saúde é: Coloque um círculo na opção que melhor a caracteriza

Excelente	1
Muito boa	2
Boa	3
Má	4
Muito má	5

2. Como qualifica a sua qualidade de vida?



A melhor possível

A pior possível. Tão má ou pior do que estar morta

3. Comparando com há um ano atrás como diria que está a sua saúde actualmente?

Muito melhor que há um ano atrás.	1
Um pouco melhor do que há um ano atrás.	2
Quase na mesma.	3
Um pouco pior do que há um ano atrás.	4
Muito pior do que há um ano atrás.	5

- 4-13. As perguntas seguintes referem-se às actividades diárias que poderá fazer durante um dia. A sua patologia limita essas actividades? Em caso positivo Quanto?

	Limita muito	Limita	Não limita
4. Grandes actividades como correr, segurar objectos pesados ou participar em desportos muito activos.	1	2	3
5. Actividades moderadas tal como mover uma mesa, passar a ferro jogar futebol ou jogar golfe.	1	2	3
6. Levantar ou carregar objectos	1	2	3
7. Subir muitos lances de escadas.	1	2	3
8. Subir um lance de escadas.	1	2	3
9. Curvar-se ajoelhar-se ou dobrar-se	1	2	3
10. Andar mais do que 1 km.	1	2	3
11. Andar muitos quarteirões.	1	2	3
12. Andar um 1 quarteirão.	1	2	3
13. Tomar banho e vestir-se.	1	2	3

As próximas questões são a cerca da sua actividade diária regular, tanto no trabalho Como em casa. Tomar conta de crianças, nas escolas, trabalhos voluntários ou fazendo serviço comunitário.

- 14-18 De há mês para cá, teve dificuldades regulares nas actividades diárias ou no trabalho como resultado de alguma limitação física?

	Sim	Não
14. Diminui o tempo que dedicava ao seu trabalho ou outras actividades.	1	2
15. Realizou menos trabalho do que o desejado.	1	2
16. Esteve limitado no seu serviço ou outras actividades que realiza.	1	2
17. Teve dificuldade no cumprimento do seu trabalho ou em outras actividades que executa.	1	2
18. Trabalhou ou executou outras actividade menos concentrado que habitualmente.	1	2

19-23 Durante o último mês, teve alguma das dificuldades abaixo referidas na execução das suas actividades diárias regulares no serviço, como resultado de algum problema emocional (depressão, ansiedade, etc.) Sim ou Não

	Sim	Não
19. Diminuiu a importância do tempo gasto no serviço ou noutras actividades.	1	2
20. Realizou menos serviço do que o habitual.	1	2
21. Foi limitado num determinado tipo de serviço ou outras actividades que costuma fazer.	1	2
22. Teve dificuldade no cumprimento do seu serviço ou noutras actividades (Exemplo fazer esforço extra).	1	2
23. Realizou o seu serviço ou outras actividades com menos atenção do que é habitual.	1	2

24. Teve alguma dor corporal durante o último mês?

Nenhuma	1
Muito leve	2
Leve	3
Moderada	4
Grave	5
Muito Grave	6

25. Durante o último mês de que forma é que as dores que sentiu interferiram no seu serviço?

Não interferiu	1
Interferiu um pouco	2
Interferiu moderadamente	3
Interferiu bastante	4
Interferiu totalmente	5

26. Durante o último mês a sua saúde psíquica ou problemas emocionais interferiram com a sua actividade social (família, amigos, vizinhos ou outros)

Não interferiu	1
Interferiu pouco	2
Interferiu	3
Interferiu bastante	4
Interferiu totalmente	5

- 27-35. As perguntas que se seguem referem-se a como se sentiu e como as coisas têm sido durante o último mês? Para uma das questões indique a resposta que lhe parece mais apropriada no que se refere aos seus sentimentos.

	Sempre	Quase sempre	Grande parte das vezes	Muitas vezes	Quase nunca	Nunca
27. Sentiu-se farta das pessoas.	1	2	3	4	5	6
28. Sentiu-se nervosa.	1	2	3	4	5	6
29. Sentiu-se em baixo e nada a fez sentir melhor.	1	2	3	4	5	6
30. Sentiu-se calma e serena.	1	2	3	4	5	6
31. Teve muita energia.	1	2	3	4	5	6
32. Sentiu-se desanimada.	1	2	3	4	5	6
33. Sentiu-se posta à parte.	1	2	3	4	5	6
34. Tem sido uma pessoa feliz	1	2	3	4	5	6
35. Sentiu-se cansada	1	2	3	4	5	6


36-43. Durante o último mês quantas vezes?

	Sempre	Quase sempre	Grande parte das vezes	Muitas vezes	Quase nunca	Nunca
36. A sua epilepsia limitou a sua actividade social (como visitar amigos ou parentes)	1	2	3	4	5	6
37. Teve dificuldade em concentrar-se e pensar	1	2	3	4	5	6
38. Teve dificuldade em manter a atenção ao exercer uma actividade mais prolongada	1	2	3	4	5	6
39. Foi desencorajado devido aos problemas com a sua saúde	1	2	3	4	5	6
40. Preocupou-se com a possibilidade ter uma crise	1	2	3	4	5	6
41. Teve dificuldade em resolver problemas como (fazer planos, tomar decisões, aprender coisas novas)	1	2	3	4	5	6
42. Foi desencorajado pelo facto de ter epilepsia	1	2	3	4	5	6
43. Os seus problemas físicos e emocionais interferiram nas suas actividades sociais (visitar amigos ou parentes)	1	2	3	4	5	6

44-48. Escolha a resposta que melhor descreva a veracidade ou não dos depoimentos seguintes

	Totalmente verdade	A maioria das vezes	Verdade	Raramente	Nunca
44. Sinto que adoço mais facilmente que as outras pessoas.	1	2	3	4	5
45. Sou tão saudável como as outras pessoas que conheço.	1	2	3	4	5
46. Tenho a expectativa que a minha saúde piore.	1	2	3	4	5
47. A minha saúde é excelente.	1	2	3	4	5
48. Sou facilmente contagiada em termos patológicos por outras pessoas.	1	2	3	4	5

49. Qual a qualidade de vida que tem tido durante o último mês?



		Muitas vezes	Algumas vezes	Poucas vezes	Nunca
50.	Durante o último mês teve problemas de memória?	1	2	3	4

51-54. Circule o número que melhor caracteriza a dificuldade que teve em se lembrar das coisas e a interferência que teve no seu trabalho e na vida diária durante o último mês.

	Sempre	Quase sempre	Grande parte das vezes	Muitas vezes	Quase nunca	Nunca	
51.	Nomes de pessoas	1	2	3	4	5	6
52.	Onde coloca os objectos	1	2	3	4	5	6
53.	O que as outras pessoas lhe dizem	1	2	3	4	5	6
54.	Coisas que leu umas horas ou dias anteriores	1	2	3	4	5	6

55-59.

As perguntas seguintes referem-se a problemas de linguagem que possa ter. Teve algum problema de fala e como é que esse problema interferiu na sua vida profissional e na sua forma de viver.

	Sempre	Quase sempre	Grande parte das vezes	Muitas vezes	Quase nunca	Nunca	
55.	Teve Problemas em procurar a palavra correcta	1	2	3	4	5	6
56.	Teve problemas em compreender o que os outros dizem numa conversa habitual	1	2	3	4	5	6
57.	Teve problemas em compreender ordens?	1	2	3	4	5	6
58.	Teve problemas em compreender o que lê	1	2	3	4	5	6
59.	Teve problemas na escrita	1	2	3	4	5	6

60-64. As perguntas seguintes referem-se a problemas de concentração que tenha tido. Teve problemas de concentração e como é que esses problemas interferiram na sua vida profissional e na sua forma de viver.

	Sempre	Quase sempre	Grande parte das vezes	Muitas vezes	Quase nunca	Nunca
60. Teve problemas em concentração na conversa	1	2	3	4	5	6
61. Teve problemas em concentração no trabalho	1	2	3	4	5	6
62. Teve problemas em concentração na leitura	1	2	3	4	5	6
64. Teve problemas na forma como reage ao que é dito ou feito	1	2	3	4	5	6

65-68. As próximas questões são acerca de problemas que pode ter tido em certas actividades e de que forma a epilepsia ou o seu tratamento tem causado problemas ao nível do:

	Sempre	Quase sempre	Muitas vezes	Quase nunca	Nunca
65. Trabalho	1	2	3	4	5
66. Relações com os amigos ou companheiros	1	2	3	4	5
67. Tempo de lazer	1	2	3	4	5
68. Condução	1	2	3	4	5

69-73. As questões que se seguem relacionam-se com o seu sofrimento acerca das suas crises.

	Muitíssimo	Muito	Pouco	Muito pouco
69.				
Fica aborrecido se tiver crises durante o próximo mês.	1	2	3	4
70.				
Preocupa-se pelo facto de se poder magoar durante as crises.	1	2	3	4
71.				
Sente-se preocupado com o constrangimento ou outros problemas sociais resultantes das crises.	1	2	3	4
72.				
Preocupa-se com o tempo despendido com a medicação.	1	2	3	4

	Muito mal	Bastante mal	Mal	Bem	Muito bem
73.					
Como lida com projectos complicados e que requerem um planeamento organizado.	1	2	3	4	5


74-80. Perante estes problemas circunde o número que melhor representa o quanto o incomoda 1=Não incomoda 5= Incomoda muito

	Não incomoda				Incomoda muito
74.					
Crises	1	2	3	4	5
75.					
Dificuldade em memorizar	1	2	3	4	5
76.					
Limitações na condução	1	2	3	4	5
77.					
Limitações no trabalho	1	2	3	4	5
78.					
Limitações sociais	1	2	3	4	5
79.					
Efeitos físicos da medicação anti epiléptica	1	2	3	4	5
80.					
Efeitos psicológicos da medicação anti epiléptica	1	2	3	4	5

81-83. Em termos da satisfação da sua vida familiar e vida social circule o número que melhor representa o que sente.

	Muitíssimo	Muito	Pouco	Muito pouco	Nunca
81.					
Qual é a sua proximidade entre você e a sua família e amigos?	1	2	3	4	5
82.					
Que apoio sente da sua família e amigos?	1	2	3	4	5

83.	Com que frequência fala com a sua família e amigos?	1	2	3	4	5
84.88.	Em termos da satisfação da sua vida familiar e vida social circule o número que melhor representa o que sente.					
		Sempre	Quase sempre	Frequentemente	Quase nunca	Nunca
84.	Durante o último mês sentiu-se satisfeito com a sua actividade sexual?	1	2	3	4	5
85.	Quantas vezes limitou a sua actividade social por causa de ter Epilepsia?	1	2	3	4	5
86.	Durante o último mês alguém esteve disponível para o ajudar ou aceitou essa ajuda?	1	2	3	4	5
87.	Durante o último mês quantas vezes se sentiu ausente	1	2	3	4	5
88.	Durante o último mês quantas vezes se sentiu isolado dos outros.	1	2	3	4	5



O melhor estado de saúde que se possa imaginar

O pior estado de saúde que se possa imaginar

Comentários

Leia e assinale cuidadosamente cada questão.

Não há repostas certas ou erradas. Procure responder o mais objectivamente possível sem se preocupar com a imagem que possa causar. Responda simplesmente de acordo com o que sente. Todas as respostas são absolutamente Confidenciais.

Em que medida tem sofrido as seguintes queixas?

	Nunca	Poucas Vezes	Algumas vezes	Muitas vezes	Muitíssimas vezes
1- Dores de cabeça	0	1	2	3	4
2- Nervosismo ou tensão interior.....	0	1	2	3	4
3- Pensamentos desagradáveis que não lhe deixam o espírito em paz.....	0	1	2	3	4
4-Desmaios ou tonturas.....	0	1	2	3	4
5-Diminuição do interesse ou prazer sexual.....	0	1	2	3	4
6-Sentir-se criticado pelos outros	0	1	2	3	4
7-Impressão de que as outras pessoas podem controlar os seus pensamentos.....	0	1	2	3	4
8-Ideia de que as outras pessoas são culpadas pela maioria dos seus problemas.....	0	1	2	3	4
9-Dificuldade em se lembrar de coisas passadas recentes.....	0	1	2	3	4
10-Muitas preocupações com a limpeza e arrumação.....	0	1	2	3	4
11-Aborrece-se e irrita-se facilmente.....	0	1	2	3	4
12-Dores sobre o coração.....	0	1	2	3	4
13-Sentir medo na rua ou nos espaços abertos.....	0	1	2	3	4
14-Falta de forças ou lentidão.....	0	1	2	3	4
15-Pensamentos de acabar com a vida.....	0	1	2	3	4
16-Ouvir vozes que as outras pessoas não ouvem.....	0	1	2	3	4
17- Tremer.....	0	1	2	3	4
18- Sentir que não se pode confiar na maioria das pessoas.....	0	1	2	3	4
19-Perder o apetite.....	0	1	2	3	4
20-Virem as lágrimas facilmente aos olhos.....	0	1	2	3	4

	Nunca	Poucas Vezes	Algumas vezes	Muitas vezes	Muitíssimas vezes
21-Sentir-se tímido ou pouco à vontade com pessoas do sexo oposto.....	0	1	2	3	4
22-Impressão de se sentir preso ou apanhado em falta.....	0	1	2	3	4
23-Ter medo súbito sem razão para isso.....	0	1	2	3	4
24-Impulsos que não consegue controlar.....	0	1	2	3	4
25-Medo de sair de casa sozinho.....	0	1	2	3	4
26- Acusar-se a si mesmo a propósito de qualquer coisa.....	0	1	2	3	4
27-Dores no fundo das costas.....	0	1	2	3	4
28-Dificuldades em fazer qualquer trabalho.....	0	1	2	3	4
29-Sentir-se sozinho.....	0	1	2	3	4
30-Sentir-se triste.....	0	1	2	3	4
31-Sentir-se muito pensativo (cismático) a cerca das coisas.....	0	1	2	3	4
32-Sem interesse por nada.....	0	1	2	3	4
33-Sentir-se atemorizado.....	0	1	2	3	4
34-Sentir-se ofendido facilmente nos seus sentimentos.....	0	1	2	3	4
35-Ter a impressão de que as outras pessoas conhecem os seus pensamentos secretos.....	0	1	2	3	4
36-Sentir que os outros não o compreendem.....	0	1	2	3	4
37-Sentir que as outras pessoas não são amigas ou não gostam de si.....	0	1	2	3	4
38-Fazer tudo devagar para ter a certeza de que fica bem feito.....	0	1	2	3	4
39-Palpitações ou batimentos rápidos do coração.....	0	1	2	3	4
40-Vontade de vomitar ou mal estar no estômago.....	0	1	2	3	4
41-Sentir-se inferior aos outros.....	0	1	2	3	4
42-Dores musculares.....	0	1	2	3	4
43-Impressão de que os outros o costumam observar ou falar de si.....	0	1	2	3	4

	Nunca	Poucas Vezes	Algumas vezes	Muitas vezes	Muitíssimas vezes
44-Dificuldades em adormecer.....	0	1	2	3	4
45-Sentir necessidade de verificar várias vezes o que faz.....	0	1	2	3	4
46-Dificuldade em tomar decisões.....	0	1	2	3	4
47-Medo de viajar de comboio ou de autocarro.....	0	1	2	3	4
48-Sensação de que lhe falta o ar.....	0	1	2	3	4
49-Calafrios ou afrontamentos.....	0	1	2	3	4
50-Ter de evitar certas coisas, lugares ou actividades porque lhe causam medo.....	0	1	2	3	4
51-Sensação de vazio na cabeça.....	0	1	2	3	4
52-Sensação se anestesia (encortiçamento ou formigueiro) no corpo.....	0	1	2	3	4
53-Impressão de ter uma bola na garganta.....	0	1	2	3	4
54-Sentir-se sem esperança perante o futuro.....	0	1	2	3	4
55-Dificuldade em se concentrar.....	0	1	2	3	4
56-Falta de força em partes do corpo.....	0	1	2	3	4
57-Sentir-se em estado de tensão ou aflição.....	0	1	2	3	4
58-Sentir um peso nos braços ou nas pernas.....	0	1	2	3	4
59-Pensamentos sobre a morte ou enterro.....	0	1	2	3	4
60-Vontade de comer demais.....	0	1	2	3	4
61-Não se sentir à vontade quando as pessoas o observam ou falam de si.....	0	1	2	3	4
62-Ter pensamentos que não lhe pertencem.....	0	1	2	3	4
63-Impulsos de bater, ferir ou ofender alguém.....	0	1	2	3	4
64-Acordar muito cedo de manhã.....	0	1	2	3	4
65-Vontade de repetir certas acções como por exemplo tocar em objectos, lavar-se ou contar.....	0	1	2	3	4
66-Sono agitado e não repousante.....	0	1	2	3	4

	Nunca	Poucas Vezes	Algumas vezes	Muitas vezes	Muitíssimas vezes
67-Vontade de destruir ou partir coisas.....	0	1	2	3	4
68-Ter pensamentos ou ideias que os outros não pertencem.....	0	1	2	3	4
69-Sentir-se embaraçado junto das outras pessoas.....	0	1	2	3	4
70-Não se sentir à vontade nas multidões (assembleias, lojas, filas, cinemas, mercados, etc.....)	0	1	2	3	4
71-Sentir que tudo o que faz é com esforço.....	0	1	2	3	4
72-Ter ataques de terror ou pânico.....	0	1	2	3	4
73-Não se sentir à vontade quando come ou bebe em lugares públicos.....	0	1	2	3	4
74-Entrar facilmente em discussões.....	0	1	2	3	4
75-Sentir-se nervoso quando tem de ficar sozinho.....	0	1	2	3	4
76-Sentir que as outras pessoas não lhe dão o devido valor ao trabalho ou às suas capacidades.....	0	1	2	3	4
77-Sentir-se sozinho mesmo quando está com mais pessoas.....	0	1	2	3	4
78-Sentir-se tão inquieto que não se pode sentar ou estar parado.....	0	1	2	3	4
79-Sentimentos de que não tem valor.....	0	1	2	3	4
80-Ter pressentimento de que algo de mal lhe vai acontecer.....	0	1	2	3	4
81-Gritar com as outras pessoas ou atirar com coisas.....	0	1	2	3	4
82-Medo de vir a desmaiar diante de outras pessoas.....	0	1	2	3	4
83-Impressão de que se deixasse, as outras pessoas se aproveitariam de si.....	0	1	2	3	4
84- Pensamentos acerca de assuntos sexuais que o perturbam muito.....	0	1	2	3	4
85-Sentimentos de que deveria ser castigo pelos seus pecados.....	0	1	2	3	4
86-Pensamentos ou imagens assustadores.....	0	1	2	3	4
87-A impressão de que alguma coisa grave se passa no seu corpo.....	0	1	2	3	4

	Nunca	Poucas Vezes	Algumas vezes	Muitas vezes	Muitíssimas vezes
88-Grande dificuldade em sentir-se "próximo" de outras pessoas.....	0	1	2	3	4
89-Sentimento de culpa.....	0	1	2	3	4
90-Impressão de que alguma coisa não regula bem da cabeça.....	0	1	2	3	4

Verifique por favor se respondeu a todas as questões

Anexo 2
Declaração de Consentimento informado

Declaração de Consentimento informado

Eu _____ declaro que consinto participar no projecto de investigação a ser levado a cabo por Liliana da Ascensão Alves Valbom Técnica de Neurofisiologia, no âmbito da sua candidatura a grau de mestre pela Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário Sob a orientação do Prof. Doutor Victor Viana.

A investigação tem como objectivos gerais:

- Avaliar a dor provocada pelo estigma ainda existente na epilepsia.
- Avaliar a qualidade de vida dos doentes com epilepsia
- Verificar em que medida o aumento da ansiedade pode desencadear um aumento de crises em doentes epilépticos.

Confirmando que me foram dadas todas as informações que foram solicitadas, e fui informado da minha liberdade de autorização ou não de participar e/ou desistir a qualquer momento e de que a recusa de participação ou a desistência, não terão qualquer influencia no meu tratamento, me foram facultadas respostas a dúvidas, me foi assegurada a confidencialidade da informação recolhida; me foi assegurada que no final do projecto, caso pretenda, me serão facultadas informações sobre as conclusões do mesmo.

Braga, ____ / ____ / ____

Investigador

Participante

Anexo 3

Pedido de Autorização da realização do estudo
perante o Hospital de S. Marcos Braga

Braga, 17 de Novembro de 2005

Ex.mo. Sr. Presidente Conselho de
Administração do Hospital de S.
Marcos de Braga

Liliana da Ascensão Alves Valbom, Técnica de Neurofisiologia deste hospital, com o N.º Mec. 2797, estando a frequentar o 2º ano do mestrado em Psicologia da dor, na Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário (CESPU), vem por este meio solicitar a V. Excelência a permissão para a realização de uma investigação com pacientes desta instituição.

Para tal pretendo realizar um estudo distribuindo questionários, nomeadamente o questionário QOLIE-89 para a avaliação da dor e qualidade de vida o questionário SCL-90, a doentes com epilepsia, com crises generalizadas e crises parciais. A amostra será de 90 pessoas na faixa etária entre os 18 e 35 anos, cujo o plano de trabalho decorrerá de acordo com o documento em anexo.

A orientação desta dissertação com o título Epilepsia, dor e ansiedade é da responsabilidade do Professor Doutor Vítor docente da Universidade CESPU.

Só serão incluídos e investigados pacientes que tenham dado o seu consentimento e que tenham tido o conhecimento das responsabilidades éticas a que estou sujeita.

Os Objectivos do estudo são:

- Avaliar a dor provocada pelo estigma ainda existente na epilepsia.
- Avaliar a qualidade de vida em doentes com epilepsia
- Verificar em que medida o aumento da ansiedade pode desencadear um aumento de crises em doentes epiléticos.

Comprometo-me a salvaguardar todos os dados pessoais dos doentes, não os incluindo nos resultados finais.

Os resultados deste estudo serão comunicados a esta instituição.

Pede deferimento

Com os melhores cumprimentos

Liliana da Ascensão Alves Valbom

Anexo 4

Autorização do Hospital de S. Marcos Braga para a
realização do estudo